小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名　膵がん

申請レジメン名　FOLFIRINOX　　催吐リスク　高度

放射線治療併用	□有	☑無	根拠文献	N Engl J Med.364(19): 1817-25(2011)
1コースの目安	1コース	14日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	100ml		中心静注	ライン確保・フラッシュ用		○													
2	アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50ml 9.9mg		中心静注	15分		○													
3	オキサリプラチン点滴静注液 大塚糖液5%	85mg/㎡ 250ml		中心静注	120分		○													
4	レボホリナート点滴静注用 生理食塩水	200mg/㎡ 250ml		中心静注	120分		○													
5	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩水	150mg/㎡ 250ml	*レボホリナート開始30分後から開始	中心静注	90分		○													
6	5-FU注 生理食塩水	400mg/㎡ 50ml	*レボホリナート終了後投与	中心静注	5分		○													
7	5-FU注 生理食塩水	2400mg/㎡ 150ml	*シュアフューザーポンプ使用	中心静注	46h		○													
8	イメンドカプセル	初日:125mg 2,3日目:80mg		内服			分1	分1	分1											
9	デカドロン錠0.5mg	8mg/day		内服				分2	分2	分2										
10																				

注意事項	備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 ＊このシートは1コース分が記載されています。 ＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減