小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名　膵がん

申請レジメン名　GEM+nab-PTX　　催吐リスク　中度

放射線治療併用	□有	☑無	根拠文献	[1]Engl J Med.369(18): 1691-703(2013).
1コースの目安	1コース	28日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○							○							○													
2	グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液	1mg/50ml 6.6mg		点滴静注	15分		○							○							○													
3	アプラキサン点滴静注液 生理食塩水	125mg/㎡ 100ml	*1V当たり生理食塩水20mlで溶解し、必要量空ボトル	点滴静注	30分		○							○							○													
4	生理食塩水	50ml		点滴静注	5分		○							○							○													
5	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩水	1000mg/㎡ 100ml		点滴静注	30分		○							○							○													
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		

注意事項
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
＊このシートは1コース分が記載されています。
＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）

デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減