

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名	乳がん	
申請レジメン名	T-DXd	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	21日

催吐リスク	中-高度
根拠文献	N Engl J Med. 2022; 387(1):9-20.
投与回数上限	☐ 有 (回) ☐ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	大塚糖液5%	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○																				
2	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg		点滴静注	30分		○																				
3	大塚糖液5%	50ml		点滴静注	5分		○																				
4	エンハーツ点滴静注 大塚糖液5%	5.4mg/kg 100mL	*1V当たり注射用水5mlで溶解 *フィルター付きライン使用 *遮光	点滴静注	*初回90分 2回目以降～30分		○																				

注意事項 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 * このシートは1コース分が記載されています。 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。 * 制吐対策は個別対応。	備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) * 投与中、点滴バッグを遮光して投与を行い、調整及び投与は4hr以内に行うこと * 用量調節:5.4→4.4→3.2 * 間質性肺炎に注意。乾いた咳、微熱、息切れ時はTEL。
--	--