

抗血小板・抗凝固薬・糖尿病薬以外で休薬が必要な薬剤 (当院非採用薬含む)

【女性ホルモン関連薬】

分類	商品名	成分	休薬期間	備考
低用量経口避妊剤	アンジュ21錠・28錠	エチニルエストラジオール レボノルゲスト렐	術前4週間	術前4週間、術後2週間 血液凝固能が亢進 されるため禁忌
	トリキュラー錠21・28	エチニルエストラジオール レボノルゲスト렐		
	ラベルフィーユ21錠・28錠	エチニルエストラジオール レボノルゲスト렐		
	シンフェーズT28錠	エチニルエストラジオール ノルエチステロン		
	ファボワール錠21・28	エチニルエストラジオール デソゲスト렐		
	マーベロン21・28	エチニルエストラジオール デソゲスト렐		
月経困難症治療剤	ヤーズ配合錠	エチニルエストラジオール	術後1週間	血液凝固能亢進のため 術後1週間禁忌
	ヤーズフレックス配合錠	ベータテクスドロスピレノン		
	フリウェル配合錠LD・ULD	エチニルエストラジオール ノルエチステロン		
	ルナベル配合錠LD・ULD	エチニルエストラジオール ノルエチステロン		
	ジェミーナ配合錠	エチニルエストラジオール レボノルゲスト렐		
(a)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル	術後1週間	血液凝固能亢進のため 術後1週間禁忌
(b)	エビスタ錠	ラロキシフェン	術前72時間	長期不動状態前から 歩行可能になるまで休薬
	ラロキシフェン錠	ラロキシフェン		
	ビビアント錠	バゼドキシフェン		
	バゼドキシフェン錠	バゼドキシフェン		

a : 黄体ホルモン

b : SERM

医師の判断により休薬を検討

ウェールナラ配合錠、エストラーナテープ、エストリール錠、ジュリナ錠、ティビゲル、プラノバール配合錠、フレマリン錠、ホーリン錠、メノエイドコンビパッチ、ル・エストロジェル、ルティナス腫錠

【降圧薬】

分類名	休薬期間	備考
アンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE阻害薬）	手術当日	血圧低下や腎機能障害の恐れあり 手術前24時間は 投与しないことが望ましい
アンジオテンシンII受容体拮抗薬（ARB）		
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI）		

※降圧薬中止に関しては主治医の指示を確認してください。

※降圧薬の一覧については別紙参照

【抗悪性腫瘍薬】

分類名	休薬期間	備考
抗VGEF抗体	添付文書 参照	創傷治癒遅延の恐れあり 手術前後は休薬が望ましい
マルチキナーゼ阻害薬（VEGFR阻害薬+他TKI）		
VEGF阻害薬（VEGF受容体融合蛋白）		
抗VGEFR2抗体		

※休薬期間については患者さんの状態に応じて検討する必要あり。添付文書等参考にして下さい。

※抗悪性腫瘍薬の一覧については別紙参照