

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名	胆道癌	
申請レジメン名	Durvalumab	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	28日

催吐リスク	最小度
根拠文献	NEJM Evid. 2022 Aug;1(8):EVID0a220 0015.
投与回数上限	☐ 有 (回) ☒ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	大塚生食注	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○																											
2	イミフィンジ点滴静注 大塚生食注	1500mg/body 250mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注	60分		○																											

注意事項 *レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 *このシートは1コース分が記載されています。 *1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) GC+Durvalumab 8コース終了後、施行。 イミフィンジは体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg。
---	---