小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	膵がん		
申請レジメン名	GEM	催吐リスク	軽度
放射線治療併用	□有　☑無	根拠文献	J Clin Oncol. 1997 Jun;15(6):2403-13.
1コースの目安	1コース　28日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○							○							○													
2	生理食塩液 デキサート注射液	50ml 6.6mg		点滴静注	15分		○							○							○													
3	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩水	1000mg/㎡ 100ml		点滴静注	30分		○							○							○													

注意事項	備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 ＊このシートは1コース分が記載されています。 ＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減