小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	多発性骨髄腫		
申請レジメン名	IsaPd療法	催吐リスク	軽度
放射線治療併用	□有　☑無	根拠文献	Lancet. 2019 Dec 7;394(10214):2096-2107.
1コースの目安	1コース　28日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

【サイクル1】

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	大塚生食注	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○							○							○							○						
2	大塚生食注 デキサート注射液 ファモチジン静注 ポララミン注	100mL 19.8mg 20mg 5mg	サークリサ投与の15分前までに終了	点滴静注	45分		○							○							○							○						
3	大塚生食注	50ml		点滴静注	15分		○							○							○							○						
4	サークリサ点滴静注 大塚生食注	10mg/kg 250mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注			○							○							○							○						
5	ポマリストカプセル	4mg/day		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							

【サイクル2～】

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	大塚生食注	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○														○													
2	大塚生食注 デキサート注射液 ファモチジン静注 ポララミン注	100mL 19.8mg 20mg 5mg	サークリサ投与の15分前までに終了	点滴静注	45分		○														○													
3	大塚生食注	50ml		点滴静注	15分		○														○													
4	サークリサ点滴静注 大塚生食注	10mg/kg 250mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注			○														○													
5	ポマリストカプセル	4mg/day		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
6	レナデックス錠	40mg/day		内服										○														○						

注意事項	備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 ＊このシートは1コース分が記載されています。 ＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	ポマリスト、レナデックス、デキサメタゾンの用量は患者の年齢・生理機能で調節します。