

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名	胃がん	
申請レジメン名	SOX(100)+HER	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	21日

催吐リスク	中等度
根拠文献	Cancer Chemother Pharmacol. 2020 Jan;85(1):217-223
投与回数上限	☐ 有 (☐ 回) ☒ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	大塚生食注	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○																				
2	トラスツズマブBS点滴静注 大塚生食注	(初回) 8mg/kg (2回～) 6mg/kg 250mL	*注射用水で21mg/mLに溶解 *フィルター付きライン使用	点滴静注	初回90分、2回～30分		○																				
3	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg		点滴静注	30分		○																				
4	オキサリプラチン点滴静注液 大塚糖液5%	100mg/ m ² 250mL		点滴静注	120分		○																				
5	TS-1	40mg/ m ² /回		内服			朝 タ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
6	デカドロン錠0.5mg	4mg/ day		内服				分2	分2																		

注意事項 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 * このシートは1コース分が記載されています。 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) TS-1は2週間内服、1週間休業。 デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減
--	---