小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	急性骨髄性白血病		
申請レジメン名	azacitidine(皮下)+ベネクレクスタ	催吐リスク	中等度
放射線治療併用	□有　☑無	根拠文献	N Engl J Med. 2020 Aug 13;383(7):617-29.
1コースの目安	1コース　28日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンゼリー	1包		内服			○	○	○	○	○	○	○																					
2	ビダーザ注射用	75mg/㎡	*注射用水で懸濁	皮下投与	数分		○	○	○	○	○	○	○																					
3	ベネクレクスタ錠	備考参照		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注意事項
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
＊このシートは1コース分が記載されています。
＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）

ベネクレクスタ錠：1サイクル目はday1　100mg、day2　200mg、day3以降　400mg。
2サイクル目以降はday1から400mg。