

対象疾患名	乳がん	
申請レジメン名	(Q1W)CBDCA+Pac +Pembrolizumab	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	21日

催吐リスク	中等度
根拠文献	N Engl J Med 2022; 386: 556-567
投与回数上限	☒ 有 (4回) ☐ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○										○										
2	キイトルーダ点滴静注 大塚生食注	200mg/body 100mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注	30分		○																				
3	大塚生食注	50mL		点滴静注	5分		○																				
4	パロノセトロン点滴静注/バッグ ファモチジン静注 ボララミン注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg 5mg 9.9mg		点滴静注	30分		○							○				○									
5	パクリタキセル注 大塚生食注	80mg/m ² 250mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注	60分		○							○				○									
6	カルボプラチン点滴静注液 大塚生食注	AUC 1.5 250mL		点滴静注	60分		○							○				○									

注意事項 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 * このシートは1コース分が記載されています。 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減
--	--