小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	乳がん		
申請レジメン名	ドセタキセル単独療法（70）	催吐リスク	軽度
放射線治療併用	□有	☑無	根拠文献	N Engl J Med.358(16): 1663-71(2008).
1コースの目安	1コース	21日	投与回数上限	☑有（4回）□無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○																				
2	グラニセトロン点滴静注バッグ デキサメタゾン注射液	1mg/50ml 6.6mg		点滴静注	30分		○																				
3	ドセタキセル注 生理食塩液	70mg/㎡ 250ml		点滴静注	60分		○																				
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											

注意事項	備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 ＊このシートは1コース分が記載されています。 ＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減