

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 大腸がん

申請レジメン名 mFOLFOX6

催吐リスク 中度

放射線治療併用 有 無

根拠文献 Clin Oncol.27(20):3385-90(2009).

1コースの目安 1コース 14日

投与回数上限 有(回) 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	生理食塩液	100ml		中心静注	ライン確保・フラッシュ用		○																				
2	アロキシ点滴静注バッグ デキサート注射液	0.75mg/50ml 9.9mg		中心静注	15分		○																				
3	レボホリナート点滴静注用 大塚糖液5%	200mg/m ² 250ml		中心静注	120分		○																				
4	オキサリプラチン点滴静注液 大塚糖液5%	85mg/m ² 250ml	*レボホリナート と 同時投与	中心静注	120分		○																				
5	5-FU注 生理食塩水	400mg/m ² 50ml		中心静注	5分		○																				
6	5-FU注 生理食塩水	2400mg/m ² 150ml	*ニューアプュー ザーポンプ使用	中心静注	46h		○																				
7	デカドロン錠0.5mg	4mg/day		内服						分2	分2																
8																											
9																											
10																											

注意事項
 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
 * このシートは1コース分が記載されています。
 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準)

デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減