

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 乳がん

申請レジメン名 PER+HER+ドセタキセル

催吐リスク 軽度

放射線治療併用 有 無

根拠文献 N Engl J Med
366:109-119,2012

1コースの目安 1コース 21日

投与回数上限 有(回)無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・ フラッシュ用		○																							
2	パージェタ点滴静注 生理食塩水	420mg 250ml	*初回840mg	点滴静注	*初回60分 2回目以降～30分		○																							
3	生理食塩液	100ml	*2回目以降 は省略	点滴静注	60分		○																							
4	ハーセプチン注射用 生理食塩水	6mg/kg 250ml	*初回8mg/kg	点滴静注	*初回90分 2回目以降～30分		○																							
5	ツフネセドロン点滴静注パウ グ	1mg/50ml 6.6mg		点滴静注	15分		○																							
6	ドセタキセル注 生理食塩液	75mg/m ² 250ml		点滴静注	60分		○																							
7																														
8																														
9																														
10																														

<p>注意事項 *レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 *このシートは1コース分が記載されています。 *1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。</p>	<p>備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減</p>
---	---