

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 乳がん

申請レジメン名 PER+HER+パクリタキセル

催吐リスク 軽度

放射線治療併用 有 無

根拠文献 N Engl J Med.366(2)
109-19(2012).

1コースの目安 1コース 21日

投与回数上限 有 (回) 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	レスタミンコワーク錠10mg	50mg/day		内服	パクリタキセル30分前		分1											分1														
2	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・ フラッシュ用		○											○														
3	パージェタ点滴静注 生理食塩水	420mg 250ml	*初回840mg	点滴静注	*初回60分 2回目以降～30分		○																									
4	生理食塩液	100ml	*2回目以降 は省略	点滴静注	60分		○																									
5	ハーセプチン注射用 生理食塩水	6mg/kg 250ml	*初回8mg/kg	点滴静注	*初回90分 2回目以降～30分		○																									
6	クワンセトロン点滴静注 デキサト注射液 フッフェニジン糖注20mg	1mg/50ml 6.6mg 20mg		点滴静注	30分		○											○														
7	パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m ² 250ml	*フィルター付き ライン使用	点滴静注	60分		○											○														
8																																
9																																
10																																

注意事項
 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
 * このシートは1コース分が記載されています。
 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準)
 デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減
 パクリタキセルはフィルター付きライン使用