小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	乳がん		
申請レジメン名	TC 75/600	催吐リスク	中等度
放射線治療併用	□有　☑無	根拠文献	J Clin Oncol. 2009 Mar 10;27(8):1177-83.
1コースの目安	1コース　21日	投与回数上限	□有（　回）□無

レジメン内容

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	大塚生食注	100mL		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○																				
2	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg		点滴静注	30分		○																				
3	ドセタキセル点滴静注 大塚生食注	75mg/㎡ 250mL		点滴静注	60分		○																				
4	注射用エンドキサン 大塚生食注	600mg/㎡ 250mL		点滴静注	60分		○																				

注意事項
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
＊このシートは1コース分が記載されています。
＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）

デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減
術後補助化学療法の場合、4コース。
浮腫対策としてday2-4にデキサメタゾン内服が処方されることがあります。