

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名 乳がん

申請レジメン名 パクリタキセル週1回  
投与法(乳がん)

催吐リスク 軽度

放射線治療併用 有 無

根拠文献 N Engl J Med  
358:1663, 2008

1コースの目安 1コース 7日

投与回数上限 有(12回) 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day								
							1	2	3	4	5	6	7		
1	レスタミンコーワ錠10mg	50mg/day		内服	パクリタキセル30分前		分1								
2	生理食塩液	100ml		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○								
3	グラニセトロン点滴静注/バッグ デキサート注射液 ファモチジン静注20mg	1mg/50ml 6.6mg 20mg		点滴静注	30分		○								
4	パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250ml	*フィルター付き ライン使用	点滴静注	60分		○								
5															
6															
7															
8															
9															
10															

注意事項  
 \* レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。  
 \* このシートは1コース分が記載されています。  
 \* 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準)  
 デキサメタゾン注は、耐糖能等によって適宜増減  
 パクリタキセルはフィルター付きライン使用