

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名	乳がん	
申請レジメン名	wPTX(90)+Bmab	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	28日

催吐リスク	軽度
根拠文献	N Engl J Med. 2007 Dec 27;357(26):2666-76.
投与回数上限	☐ 有 (回) ☒ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	レスタミンコーワ錠10mg	5錠		内服	パクリタキセル30分前		分1										分1																	
2	大塚生食注	100mL		点滴静注	ライン確保・フラッシュ用		○										○																	
3	グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液 ファモチジン静注	1mg/50mL 6.6mg 20mg		点滴静注	30分		○										○																	
4	パクリタキセル注 大塚生食注	90mg/m ² 250mL	*フィルター付きライン使用	点滴静注	60分		○										○																	
5	ペバシズマブBS点滴静注 大塚生食注	10mg/kg 100mL	全量100mL	点滴静注	初回90分,2回目60分, 3回目以降30分		○										○																	

注意事項 * レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 * このシートは1コース分が記載されています。 * 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準) デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減
--	--