

小川赤十字病院 化学療法レジメン

対象疾患名	大腸癌	
申請レジメン名	XELOX(130)+Bmab(7.5)	
放射線治療併用	☐ 有	☒ 無
1コースの目安	1コース	21日

催吐リスク	中等度
根拠文献	Ann Oncol. 2018 Mar 1;29(3):624-631
投与回数上限	☐ 有(回) ☒ 無

レジメン内容

No.	抗がん剤名 (溶解液等を含む)	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間 (投与速度)	上限量	Day																				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	大塚生食注	100mL		点滴静注	ライン確保・ フラッシュ用		○																				
2	ペバシズマブBS点滴静注 大塚生食注	7.5mg/kg 100mL	全量100mL	点滴静注	初回90分,2回目60分, 3回目以降30分		○																				
3	パロノセトロン点滴静注バッグ アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg		点滴静注	30分		○																				
4	オキサリプラチン点滴静注液 大塚糖液5%	130mg/m ² 250mL		点滴静注	120分		○																				
5	ゼローダ錠	1000mg/m ² /回		内服			朝 タ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
6	デカドロン錠0.5mg	4mg/day		内服				分2	分2																		

注意事項
* レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。
* このシートは1コース分が記載されています。
* 1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。

備考(化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準)

デキサメタゾンは、耐糖能等によって適宜増減
ゼローダ錠は2週間内服、1週間休薬。